

Desinfektion

Rapidchlor 50

Chlortabletten schnelllöslich, 20 g



Verwendung & Eigenschaften

Desinfektionsmittel und Algizid für Badewasser in Privatschwimmbäder für berufliche und private Verwender. Schnelllösliche Tabletten à 20 g zur Schockdesinfektion. Erhöht schnell den Chlorgehalt des Wassers. Durch die Tablettenform kann die benötigte Menge einfach abgezählt statt gewogen werden. Dadurch sind die Tabletten besonders anwenderfreundlich. Zur Stoss- und Dauerchlorung.



Dosierung & Anwendung

Zugabemenge bei Neufüllung und der etwa alle 2 Wochen zu erfolgenden Stosschlorung: 3 – 5 Tabletten / 10 m³. Laufender Betrieb: 1 Tablette/10 m³ ca. alle 3 Tage. Jedoch so viel zugeben, dass am Beckenauslauf mind. 0,5 mg/l freies Chlor nachzuweisen sind. Tabletten in den Skimmer/Überlauf oder Dosierschwimmer geben.

Sicherheitsrelevante Daten

Gefahr Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. **Erste-Hilfe-Massnahmen:** **Hautkontakt:** Sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. Bei Verbrennungen mit kaltem Wasser abspülen, bis Schmerz abklingt, dann Arzt aufsuchen. **Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schützen. Sofort Augenarzt konsultieren. Sofort mit viel Wasser mindestens 5 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. **Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen und 1-2dl Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflössen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

- **Wirkstoff** Symclosen, CAS Nr. 87-90-1, 55,5 g/100 g.
- **Enthält** Natriumcarbonat, CAS Nr. 497-19-8.
- **UN3077**
- **UFI** RC80-V0P3-U009-1H2H
- **CHZB0526**
- **Verfügbare Packungsgrößen** 1 | 3 | 5 kg
- **Piktogramme**

