

Desinfektion

Tabbylong 88

Chlortablette, 200 g



Verwendung & Eigenschaften

Desinfektionsmittel und Algizid für Badewasser in Privatschwimmbäder für berufliche und private Verwender. Langsam löslich, zur Dauerchlorung, geeignet für alle Arten von Wasser.



Dosierung & Anwendung

1 Tablette à 200 g für 30 m³ Beckenwasser ca. alle 5-10 Tage. Am Beckenauslauf sollten mind. 0,5 mg/l freies Chlor nachzuweisen sein. Tabletten in den Dosierschwimmer, Skimmer oder Überlauf geben.

Sicherheitsrelevante Daten

Gefahr Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.
Erste-Hilfe-Massnahmen: Einatmen: Sofort einen Arzt verständigen. **Hautkontakt:** Bei Verbrennungen mit kaltem Wasser abspülen, bis Schmerz abklingt, dann sofort Arzt aufsuchen. **Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schützen. Augenarzt konsultieren. Sofort mit viel Wasser mindestens 5 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. **Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen und 1-2dl Wasser nachtrinken. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflössen. Sofort ärztlichen Rat einholen. Erbrechen möglichst verhindern.

- **Wirkstoff** Symclosen, CAS Nr. 87-90-1, 99 g/100 g.
- **UN3077**
- **UFI AR70-A0UA-P00U-E402**
- **CHZB0545**
- **Verfügbare Packungsgrössen** 3 | 5 | 10 kg
- **Piktogramme**

