

Désinfection

Rapidchlor 50

Galet de chlore à dissolution rapide, 20g



Usage & Caractéristiques

Désinfectant et algicide pour eau de piscines privées pour utilisation professionnelle et privée. Pastilles à dissolution rapide de 20 g pour les désinfections choc. Augmente rapidement la teneur en chlore de l'eau. Grâce à sa présentation en pastilles, la quantité peut être comptée simplement au lieu d'être pesée. De ce fait les pastilles sont particulièrement faciles à utiliser.



Dosage & Application

Quantité à ajouter pour un nouveau remplissage et la chloration choc à intervenir environ toutes les 2 semaines : 3 à 5 pastilles / 10 m³. Fonctionnement continu : 1 pastille pour 10 m³ env. tous les 3 jours. En ajouter toutefois suffisamment pour trouver à la sortie du bassin au minimum 0,5 mg / l de chlore libre. Déposer les pastilles dans le skimmer/trop plein ou doseur flottant.

Données relatives à la sécurité

Danger Peut aggraver un incendie; comburant. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée. **Premiers secours: Contact avec la peau:** Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. En cas de brûlures appliquer de l'eau froide jusqu'à ce que la douleur disparaisse puis demander un avis médical. **Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Protéger l'oeil intact. Consulter immédiatement un ophtalmologiste. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 5 minutes. **Ingestion:** Se rincer la bouche à l'eau puis boire 1-2dl d'eau. Éviter le vomissement si possible. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.

- Principe actif Symclosène, N° CAS 87-90-1, 55.5 g/100 g.
- Contient Carbonate de sodium, N° CAS 497-19-8.
- UN3077
- UFI RC80-V0P3-U009-1H2H
- CHZB0526
- Taille de l'emballage 1 | 3 | 5 kg
- Pictogrammes

