

## Désinfection

# Tabbylong 88

Chlore en pastilles, 200 g



### Usage & Caractéristiques

Désinfectant et algicide pour eau de piscines privées pour utilisation professionnelle et privée. Dissolution lente, pour la chloration permanente, convient à tous les types d'eau.



### Dosage & Application

1 galet de 200 g pour 30 m<sup>3</sup> d'eau tous les 5-10 jours environ. A la sortie du bassin, il faut obtenir au minimum de 0,5 mg/l de chlore libre. Ajouter les galets dans le flotteur de dosage, dans le skimmer ou dans le troplein.

### Données relatives à la sécurité

**Danger** Peut aggraver un incendie; comburant. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée. **Premiers secours:** **Inhalation:** Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. **Contact avec la peau:** En cas de brûlures appliquer de l'eau froide jusqu'à ce que la douleur disparaisse puis demander immédiatement un avis médical. **Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Protéger l'oeil intact. Consulter un ophtalmologiste. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 5 minutes. **Ingestion:** Se rincer la bouche à l'eau puis boire 1-2dl d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin. Éviter le vomissement si possible.

- Principe actif Symclosène, N° CAS 87-90-1, 99 g/100 g.
- UN3077
- UFI AR70-A0UA-P00U-E402
- CHZB0545
- Taille de l'emballage 3 | 5 | 10 kg
- Pictogrammes

