

Disinfezione

Broma

Pastiglie a scioglimento lento, 20 g a base di bromo



Utilizzo & Caratteristiche

Disinfettante e algicida per acqua di piscine private, per utenti privati e professionali. Legame organico a base di bromo. Solubile lentamente e senza residui. Può essere utilizzato indipendentemente dalla durezza dell'acqua.



Dosaggio & Modo d'impiego

Piscina funzionamento continuo: aggiungere fino a che all'uscita dalla vasca non sia dimostrabile una quantità minima di 1,0 mg/l die bromo libero. Secondo la quantità e tipo dei fattori che consumano il bromo, 3-4 pastiglie/10 m³ sono sufficienti per 5-10 giorni. L'applicazione ideale sarebbe tramite un dosatore speciale per bromo. L'utilizzo tramite un dosatore galleggiante per pastiglie potrà solo essere una soluzione provvisoria, per via della solubilità molto lenta del bromo.

Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici. A contatto con acidi libera gas tossici. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere/i gas. Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con altre sostanze/combustibili. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi. Smaltire il contenuto / contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. **Misure di primo soccorso Inalazione:** Chiamare immediatamente un medico o il Centro Antiveneni. **Contatto con la pelle:** Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 min. Proteggere l'occhio illeso. Consultare l'oculista. **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Se possibile trattenere il vomito. Consultare immediatamente un medico.

- **Ingrediente attivo** Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione, N. CAS 32718-18-6, 100 g/100 g.
- UN3085
- UFI G690-X0K2-W007-NWW5
- CHZB0530
- **Misure del contenitore disponibili** 5 kg
- **Pittogrammi**

