

Disinfezione

Speedychlor 66

Cloro in granulato ad azione rapida



Utilizzo & Caratteristiche

Disinfettante e algicida per acqua di piscine private, per utenti privati e professionali. Granulato a scioglimento rapido, per clorazioni d'urto e clorazione continua. Ideale per ogni tipo di acqua.



Dosaggio & Modo d'impiego

Quantità da utilizzare in caso di prima applicazione oppure in caso di una clorazione d'urto (ogni due o tre settimane circa): 50-90 g/10 m³ d'acqua. Funzionamento continuo: 25 g per 10 m³ d'acqua ogni 2-3 giorni. In caso di alta frequentazione e/o temperature elevate, la quantità di dosaggio è da aumentare in proporzione. In ogni caso aggiungere fino a che all'uscita della vasca non sia dimostrabile una quantità minima di 0,5 mg/l di cloro libero. Sciogliere in un recipiente di plastica. Distribuire uniformemente sulla superficie durante la funzione dell'impianto di filtraggio.

Dati relativi alla sicurezza

Attenzione Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera gas tossici. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere / i gas / gli aerosol. Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. Indossare guanti protettivi/ Proteggere gli occhi. Smaltire il contenuto / contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. **Misure di primo soccorso:** **Inalazione:** Nei casi gravi, chiamare un medico. **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Proteggere l'occhio illeso. Consultare l'oculista. **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua e berne 1-2 dl. Se possibile trattenere il vomito. Consultare immediatamente un medico.

- **Ingrediente attivo** Dicloroisocianurato di sodio, diidrato, N. CAS 51580-86-0, 100 g/100 g.
- **UN3077**
- **UFI** FE80-DOCH-400S-QUNK
- **CHZN3045**
- **Misure del contenitore disponibili** 1 | 3 | 5 | 10 kg
- **Pittogrammi**

