

Disinfezione

Varichlor Multi

Compressa bistrato da 200 g a base di cloro



Utilizzo & Caratteristiche

Disinfettante e alghicida per l'acqua da bagno nelle piscine private per utenti professionali e privati. Innovativa compressa a due fasi da 200 g. Combina cloro a rapida e lenta dissoluzione insieme a flocculante per risultati cristallini e sforzo minimo.



Dosaggio & Modo d'impiego

1 compressa per 20 m³ ogni 7-10 giorni o quando la concentrazione di cloro è scesa sotto i 0.5 mg/l e la compressa è completamente dissolta. Il valore di cloro ideale è compreso tra 0,5 e 1,0 mg/l. Verificare il pH e, se necessario, regolarlo tra 7,0 e 7,4. Posizionare la compressa nello skimmer, preferibilmente dopo l'ultima immersione. Non adatto per l'uso in una boa dosatrice.

Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Può aggravare un incendio. Comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera gas tossici. Non deve essere accessibile ai bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare l'inalazione di polvere/fumo/gas/nebbia/vapore/aerosol. Dopo l'uso, lavare accuratamente la pelle. Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, occhiali protettivi e protezione per il viso. Smaltire il contenuto/contenitore presso un impianto di smaltimento riconosciuto. Misure di primo soccorso: Inalazione: Portare all'aria aperta se la polvere viene inalata. In caso di dubbio o se sono presenti sintomi, consultare un medico. Se il respiro è difficoltoso, somministrare ossigeno. Contatto con la pelle: Rimuovere i vestiti contaminati Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico. Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate. Proteggere l'occhio illeso. Consultare l'oculista. Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Se possibile trattenere il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

- **Ingrediente attivo** Simclosene, N. CAS 87-90-1, 78.9 g/100 g. Dicloroisocianurato di sodio diidrato, N. CAS 51580-86-0, 11.65 g/100 g.
- **Contiene** Solfato di alluminio, N. CAS 10043-01-3.
- **UN3077**
- **UFI** VOM0-N08A-T00N-2UAH
- **CHZN2013**
- **Misure del contenitore disponibili** 5 kg

